Acrux 32,87EC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Difenoconazole 250 g/l (25%)
Pyraclostrobin 78.7 g/l (7.87%)

Nombre Químico
Difenoconazole: cistrans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- 1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4- chlorophenyl ether
Pyraclostrobin: Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H- pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl}(N-methoxy)carbamate

No. CAS
Difenoconazole 119446-68-3
Pyraclostrobin 175013-18-0

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Densidad: 1,0374 g/cm3
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No es inflamable

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Acrux 32,87EC es un fungicida con acción protectante y curativa. Absorbido por las hojas con fuerte translocación translaminar y movimiento acropetal. Inhibe la demetilación del esterol y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo. Actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1.

INTEROC
Pasión por la innovación

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar con equipo manual de espalda, motorizado o con equipo terrestre acoplado al tractor. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVA-CIONES
MANÍ ***Arachis hypogaea***	Roya ***Puccinia arachidis***	0.75 – 1.0 L/Ha 0.53-0.7 L/mz	Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de roya. Volumen de aplicación: 170 L/ha (120 L/mz).
TABACO ***Nicotiana tabacum***	Moho Azul del Tabaco. ***Peronospora tabacina***	0.75 – 1.0 L/Ha 0.53-0.7 L/mz	Las aplicaciones deben iniciar a los 40 días después del trasplante, y a un intervalo de 7 días. Volumen de 400 L/ha (280 L/mz).
CAFÉ ***Coffea arabica***	Roya ***Hemileia vastatrix***	0.5 L/Ha 0.35 L/mz	Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de roya, a volumen de 500 L/ha (350 L/mz).
ARROZ ***Oryza sativa***	Complejo manchado grano ***Alternaria* sp.**	0.75-1.0 L/Ha	Aplicar en máximo embuchamiento y en 20 % de espiga.
	Añublo de la vaina ***Rhizoctonia solani***	0.53-0.7 L/mz	Aplicar en máximo macollamiento y en máximo embuchamiento
PAPA ***Solanum tuberosum***	Tizón temprano ***Alternaria solani***	0.20-0.25 L/ha 0.14 - 0.18 L/mz	Aplicar de forma preventiva cuando la enfermedad empiece a mostrar tendencia al aumento o antes del inicio de las lluvias, para evitar el desarrollo de la enfermedad. Volumen de agua: 200 L/Ha (140 L/mz).
MAÍZ ***Zea mays***	Mancha negra de maíz ***Phyllachora maydis***	0.20-0.25 L/Ha 0.14 – 0.18 L/mz	
PIMIENTO ***Capsicum annuum***	Oidium ***Leveillula taurica***	0.20L/Ha 0.14L/mz	
TOMATE ***Lycopersicum esculentum***	Tizón temprano ***Alternaria solani***	0.25-0.3 L/Ha 0.18 – 0.21 L/mz	
CEBOLLA ***Allium cepa***	Mancha púrpura ***Alternaria porri***	0.25-0.3 L/Ha 0.18 – 0.21 L/mz	

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVA-CIONES
MANGO ***Mangifera indica***	Antracnosis ***Colletotrichum gloeosporioides***	0.6 L/Ha 0.42 L/mz	Realizar una primera aplicación desde el inicio de la floración hasta 50% de floración y realizar una segunda aplicación a los 12 días. Volume de aplicación fenológico del cultivo
BANANO Y PLÁTAMO ***Musa* sp**	Sigatoka negra ***Mycosphaerella fijiensis***	0.6 L/Ha 0.42 L/mz	Se recomienda aplicar el producto en las primeras horas de la mañana. No realizar aplicaciones cerca de fuentes de agua, ni en condiciones de lluvia que permitan el arrastre del producto a otras áreas. Aplicar con surfactante siliconado a la dosis comercial

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

50 ml, 60 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 4L, 5L, 10L, 20L, 200 L.

REGISTRO

Guatemala: 1302-10

Formulador:
INTEROC S.A
Km. 16.5 Vía a Daule Guayaquil - Ecuador
Tefl.: (593-4) 216-2608
ircamregulatorio@interoc.biz

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER GUATEMALA S.A.
Alajuela, Costa Rica.

INTEROC
Pasión por la innovación