aragón 20SC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Spirotetramat 200 g/L (20.0%)

Nombre Químico

Spirotetramat: Cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspirol[4.5]dec-3-en-one; ethyl cis-3-(2.5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl carbonate

No. CAS

Spirotetramat: 203313-425-1

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Blanquecino

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No es inflamable

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Aragon 20 SC es un insecticida sistémico y de contacto, Afecta la biosíntesis de lípidos, actuando más que todo por ingestión, pero también por contacto, haciendo énfasis en huevos y larvas, con efectos adicionales en fecundidad de adultos. Una vez que penetra las hojas es des-esterificado y transportado por el xilema y floema. También tiene actividad translaminar.

RECOMENDACIONES DE USO

Aragon 20 SC se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales, en equipos agrícolas, spray boom y equipo aéreo.

Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados previamente.

MODO DE APLICACIÓN

Diluir el producto en la mitad de agua que se utilizar, agitar, completar con el volumen de agua y agitar nuevamente. Finalmente agregar Aragon 20 SC a 0.20 ml/L.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
MELÓN (***Cucumis melo***) SANDÍA (***Citrullus lanatus)*** AYOTE (***Cucurbita argyrosperma)*** PEPINO (***Cucumis sativus)*** CALABAZA ***(Cucurbita moschata)***	Mosca blanca ***(Bemisia tabaci)*** Afidos ***(Aphis spp***)	0,5 L/ha (0,35 L/mz)	Aplicar cuando se detecta presencia de plaga. Se recomienda un máximo de dos aplicaciones por ciclo de cultivo, realizar la segunda aplicación cuando los niveles de plagas superes el umbral de daño económico en un período corto, con un intervalo de al menos siete (7) días entre cada aplicación. En situaciones de baja incidencia de plagas, los controles pueden extenderse hasta 60 días.
BANANO Y PLÁTANO ***(Musa spp)***	Cochinilla algodonosa ***(Pseudococcus spp)*** Mosca blanca del banano (***Aleurodicus spp)***	0,5 L/ha (0,35 L/mz)	

*Cantidad de agua a utilizar: 200 L/ha (140 L/mz)

Período de carencia: 1 día.

INTEROC
Pasión por la innovación

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

50 ml, 60 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 4L, 5L, 10L, 20L, 200 L.

REGISTRO

Guatemala: 1302-20

Formulador:

INTEROC S.A

Km. 16.5 Vía a Daule Guayaquil - Ecuador

Tefl.: (593-4) 216-2608

ircamregulatorio@interoc.biz

TITULAR DEL REGISTRO

INTEROC CUSTER GUATEMALA S.A.

Alajuela, Costa Rica.

INTEROC

Pasión por la innovación