Kalesman 31,25 SC

INGREDIENTES ACTIVOS

Nombre Común
Dimethomorph 25,00 %m/v
Fluopicolide 6,25 %m/v

Nombre Químico
Dimethomorph: (EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine
Fluopicolide: 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide

No. CAS
Dimethomoph: 110488-70-5
Fluopicolide: 239110-15-7

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada, SC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Blanco
Olor: Característico
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

KALESMAN® 31,25 SC es un fungicida sistémico con actividad protectiva y antiesporulante de translocación acropetala en el xilema y con movilidad translaminar.

MECANISMO DE ACCIÓN

KALESMAN® 31,25 SC es un fungicida que contiene dos ingredientes activos: Dimethomorph: Inhibe la celulosa sintasa, evitando así la biosíntesis de la pared celular
Fluopicolide: provoca la redistribución de proteínas similares al espectro de la membrana al citoplasma; se cree que estas proteínas mantienen la estabilidad de la membrana en ascomicetos y oomicetos.

RECOMENDACIONES DE USO

Las aplicaciones de KALESMAN pueden ser curativas o preventivas cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda rotar el uso con fungicidas de deferente modo de acción para prevenir el desarrollo de resistencia.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Agite el envase antes de dosificar. Diluya la cantidad recomendada en un recipiente aparte con un poco de agua hasta obtener una mezcla homogénea. Agregue la premezcla en la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie que pretende tratar agitando constantemente, úselo inmediatamente, no guardar.

USOS Y DOSIS

CULTIVOS	CONTROL	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa ***Solanum tuberosum*** Tomate ***Lycopersicum esculentum*** Chile dulce ***Capsicum annuum*** Berenjena ***Solanum melongena*** Tabaco ***Nicotiana tabacum***	Tizón tardío ***Phytophthora infestans*** Tizón temprano ***Alternaria solani***	1,6 L/Ha *(1,12 L/mz)*	Realizar 2 aplicaciones por ciclo, en rotación con otras moléculas. La frecuencia de aplicación estará ligada a la severidad de la enfermedad según monitoreo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Papa: 14 días
Chile dulce, Berenjena: 7 días
Tomate, Tabaco: 3 días

COMPATIBILIDAD

KALESMAN® 31,25 SC no presenta reacción con los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA CATEGORÍA 4

! ATENCIÓN

DIRECCIÓN: Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela
TELÉFONOS: (506) 2239-4298
WEB: Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

Kalesman 31,25 SC

PRESENTACIONES

500 mL, 1 L y 5 L

REGISTRO

Guatemala: 1302-17

TITULAR DEL REGISTRO

INTEROC CUSTER GUATEMALA S.A.
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste,
Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

FORMULADOR

INTEROC S.A.
Km 16.5 Vía Daule, Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 - 4) 216 – 2608

DISTRIBUIDO POR

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER