Nycteo 57 EC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
D-Limoneno 570 g/l

Nombre Químico
D-Limoneno: (R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene (IUPAC)

No. CAS
D-Limoneno: 5989-27-5

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Densidad: 0.9093 g/ml a 25 °C
Inflamabilidad: Inflamable
Explosividad: No explosivo
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

MODO DE ACCIÓN

Nycteo 57EC es un insecticida botánico que actúa por contacto, diluyendo la capa cerosa de los insectos, lo cual le provoca una deshidratación y la muerte.

MODO DE APLICACIÓN

Se aplica dirigido al follaje, haciendo una cobertura uniforme al cultivo.
Se debe agregar el 50 % del volumen de agua y verter la dosis del producto **Nycteo 57EC**, agitarlo hasta que quede una mezcla homogénea. Luego se completa el volumen de agua, y finalmente se le agrega el coadyuvante Maxicover. Se recomiendan boquillas cono lleno 8002.
El equipo usado después de la aplicación de ser lavado adecuadamente.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
MELÓN ***Cucumis melo***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	1.5-2.0 L/ha	Aplicar en presencia de la plaga, se pueden realizar aplicaciones cada 7 días.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 7 días

PERIODO DE CARENCIA: 1 día

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

500 ml, 1 L, 4L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L

REGISTRO

Guatemala: 1302-13

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Vía Daule, Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 - 4) 216 – 2608

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23. Costa Rica.

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc-custer.com

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER